

К Р А Т К О Е

ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ЛѢКАРСТВОВѢДѢНІЕ

ИЛИ

СОКРАЩЕННОЕ ОПИСАНІЕ ДѢЙСТВІЯ

УПОТРЕБИТЕЛЬНѢЙШИХЪ

ГОМЕОПАТИЧЕСКИХЪ ЛѢКАРСТВЪ.

П О С О В І Е

къ лѣчебникамъ и руководствамъ по гомеопатіи для вѣрнѣйшаго выбора
лѣкарствъ въ болѣзняхъ людей и животныхъ.

СОСТАВИЛЪ ПО НОВѢЙШИМЪ ИСТОЧНИКАМЪ
F. v. Fleming - Ziemann, H. v. Sigmund
А. ФОНЪ ФЕЛДЕНБЕРГЪ-ЦИГЛЕРЪ.

ПЕРЕВОДЪ СЪ НѢМЕЦКАГО

подъ редакціей Д-ра А. Ф. Флеммингъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типо-Литографія К. Л. Пентковскаго, Казначейская, 6—71.

1898.

ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ЛѢКАРСТВОВѢДѢНІЕ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	СТР.		СТР.
Абротанумъ	1	Берберисъ вульгарисъ . .	53
Агарикусъ мускаріусъ . .	7	Бисмутумъ нитрикумъ . .	54
Агнусъ кастусъ	9	» карбоникумъ и	
Аза фетида	38	металликумъ . .	—
Азарумъ	39	Бовиста	57
Аконитумъ	1	Бораксъ	55
Аква силиката	269	Бріонія	60
Алюмина	10	Броміумъ	58
Амбра гризеа	12	Вакцининумъ	294
Аммоніумъ броматумъ . . .	58	Валеріана	295
» карбоникумъ . . .	14	Варіолинъ	294
» каустикумъ . . .	15	Вератрумъ альб.	296
» муріатикумъ . . .	16	» вириде	300
Анакардіумъ	17	Вербаскумъ	301
Ангустура	19	Віола Триколоръ	302
Антимоніумъ крудумъ . . .	19	Гамамелисъ	142
» сульфур. рубрумъ . .	19	Гваякумъ	141
» » ауратумъ . . .	19	Геліантусъ	144
» тартарикумъ . . .	21	Геллеборусъ	144
Апизинъ	23	Гельземіумъ	134
Аписъ-меллифика	23	Гепаръ сульфур.	145
Апоцинумъ канабин.	26	Гидрастисъ	149
Аргентумъ нитрикумъ . . .	27	Гидроціани ацид.	151
» фоліатумъ	28	Гиперикумъ	155
Аргилла	10	Гіосціамусъ	153
Арника	28	Глоџоинумъ	136
Арсеникумъ	32	Графитъ	138
Арумъ трифиллумъ	37	Дигиталисъ	119
Атропинъ	51	Дигиталинъ	119
Аурумъ муріатикумъ	40	Діоскорея	122
» натронатумъ	—	Діоскореинъ	122
» фоліатумъ	—	Дрозера	123
Баптизія	42	Дулькамара	124
Барита ацетика	44	Игнація	156
» карбоника и мурі-		Ипекакуана	162
атика	—	Ирисъ	165
Бензо ацидумъ	52	Іодумъ	160
Белладонна	46	Кактусъ	63
Беллисъ переннисъ	52	Календула	70

	СТР.		СТР.
Кали бихромикумъ	166	Мецереумъ	19
» іодатумъ	171	Миллефоліумъ	19
» нитрикумъ	210	Мошусъ	20
» карбоникумъ	168	Муріатисъ ацид.	20
Каломель	197	Натрумъ карбоникумъ и му-	
Калькареа ацетика, карбони-		ріатикумъ	20
ка, каустика, фосфорика	65	Натрумъ нитрикумъ и суль-	
Кальмія	172	фурикумъ	20
Камфора	72	Никотинъ (Табакумъ) . . .	28
Каннабисъ индика	76	Нитри ацидумъ	20
» сатива	75	Нитроглицеринъ	136
Кантарисъ	77	Нитрумъ (Кали нитрикумъ).	210
Капсикумъ	78	Нуксъ вомика	212
Карбо анималисъ	80	» мошата	211
» вегетабилисъ	—	Олеандеръ	217
Каулофилинъ	83	Опіумъ	219
Каулофиллумъ	83	Петрозелинумъ	221
Каустикумъ	85	Петролеумъ	223
Клематисъ	102	Пинусъ	232
Коккулюсъ	103	Платина	233
Коккусъ какти	105	Плумбумъ ацет. и металл.	235
Коллинсонія	109	Подофиллумъ	236
Колоцинтисъ	110	Пульсатилла	238
Кольхикумъ	107	Ранункулюсъ бульбозусъ .	243
Кольхицинъ	109	Ранункулюсъ акрисъ, —	
Коффеа	106	сцелератусъ, — фикаріа, —	
Коффеинъ	107	фламула	244
Коніинъ	113	Румексъ	251
Коніумъ	112	Рута	252
Креозотъ	173	Сабадилла	254
Кротонъ тигліумъ	115	Сабина	255
Купрумъ ацетикумъ и ме-		Самбукусъ	257
талликумъ	116	Сангвинарія	258
Лактука вироза	178	Сарсапарилла	259
Ледумъ	179	Секале корнут.	262
Лептандра	181	Селеніумъ	263
Ликоподіумъ	183	Сенега	264
Лобелія	182	Сепія	265
Ляхезисъ	175	Силицея	269
Магнезія карбоника	186	Симфитумъ	288
» муріатика	188	Спигелія	273
Манганумъ ацетик. и кар-		Спонгія	274
боникумъ	189	Станнумъ	276
Меркуріусъ вивусъ, — солю-		Стафизагрія	277
балисъ Ганем., — преци-		Стикта	279
питать красный	190	Страмоніумъ	280
Меркуріусъ сублимат. кор-		Стрихнинъ	217
розив.	195	Сульфурисъ ацид.	286
Меркур. биіодатусъ, — ціа-		Сульфуръ	282
натусъ	196	Сцилла	260
Меркур. дульцисъ, — іода-		Табакумъ	289
тусъ, — оксидат. флав., —		Тартар. стибіатусъ, — аметик.	21
сульфуратусъ	197	Теребинтина	290

	СТР.		СТР
Инктура сульфурисъ . . .	282	Цепа	87
Уя	290	Цикута вироза	97
Ртика	293	Цимицифуга	98
Элландріумъ	223	Цина	100
Эррумъ ацетикумъ,—кар-		Цинкумъ металл.	302
боник., — металликумъ,—		Циннабарисъ	197
м уріатикумъ	130	Цистусъ канаденз.	101
Итолакка	231	Эвфразія	129
л уорисъ ацид.	133	Эупаторіумъ	126
осфори ацид.	229	Эуфорбіумъ	127
осфоръ	224	Ятрофа	156
амомилла	89		
Элидоніумъ	92	Право- и лѣвосторонне дѣй-	
ина	93	ствующія средства . . .	305
ининъ	95	Сродственные средства . .	306

ЗАМѢЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ:

Стран.	Строка снизу.	Напечатано:	Должно быть:
хIII	3	въ примѣчаніи	дозволяютъ
—	2	»	невинны
1		въ заглавіи	Аковитъ
8	17	—	Витта
21		въ заглавіи	Антимоніумъ
			тартарикумъ
27		»	Аргентумъ нит-
			рикумъ
32		»	Арсеникумъ
39	11	—	Азарумъ
89	16	—	исчезаютъ

К Р А Т К О Е ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ЛѢКАРСТВОВѢДѢНІЕ.

А. фонъ-Фелленбергъ-Циглера.

ВВЕДЕНІЕ *).

Какъ каждому мастеру необходимо знать свои рабочіе инструменты, для того чтобы хорошо работать, точно также врачъ долженъ быть знакомъ съ орудіями своего ремесла, именно съ лѣкарствами, если онъ хочетъ производить хорошую работу, т. е. легко, скоро и основательно лѣчить.

Знаніе лѣкарствъ есть поэтому одно изъ первыхъ условій для каждаго, будь онъ врачъ или не-врачъ, кто хочетъ извлечь пользу изъ лѣкарствъ для себя или для другихъ.

Между тѣмъ большинство гомеопатическихъ руководствъ и домашнихъ лѣчебниковъ, какъ извѣстно, совсѣмъ не заключаютъ въ себѣ обзора гомеопатическихъ лѣкарствъ и ихъ дѣйствій, а если и заключаютъ, то большей частью въ весьма недостаточной мѣрѣ. Вслѣдствіе этого пользующемуся этими книгами приходится примѣнять средства, которыя онъ знаетъ лишь по имени или весьма неполно, что придаетъ конечно ему нѣкоторую неувѣренность, и онъ не можетъ отдавать себѣ отчета въ томъ, почему поступаетъ такъ, а не

*) Мы просимъ читателей этой книги отнюдь не пропустить этого введенія, но прочитать его со вниманіемъ, такъ какъ оно содержитъ въ себѣ указанія и предписанія, почерпнутыя изъ многолѣтняго наблюденія и опыта и весьма полезныя для гомеопата-практика.

иначе. Только въ томъ случаѣ, когда онъ знаетъ лѣкарства не только по имени, но и въ отношеніи ихъ дѣйствій, онъ можетъ лѣчить сознательно и съ нѣкоторой увѣренностію.

Цѣль настоящей книги — придти на помощь многимъ не-врачамъ, желающимъ пользоваться себя и другихъ по гомеопатическому методу лѣченія, и указать имъ тѣ факторы, которые дадутъ имъ возможность лѣчить болѣзни. Это лѣкарствовѣдѣніе, составленное въ возможно сжатой формѣ и по лучшимъ источникамъ, ограничивается наиболѣе часто употребляемыми гомеопатическими лѣкарствами и можетъ служить дополненіемъ къ гомеопатическимъ руководствамъ и лѣчебникамъ ¹⁾.

При главныхъ средствахъ, кромѣ присущаго имъ патогенеза (болѣзнетворныя дѣйствія), т. е. описанія ихъ симптомовъ, указано также, для какихъ сложений, темпераментовъ, пѣловъ, возрастовъ и т. п. (насколько это до сихъ поръ выяснено опытомъ) они преимущественно пригодны, чѣмъ часто весьма облегчается выборъ вѣрнаго средства.

При средствахъ изъ растительнаго и животнаго царствъ указана также та часть растенія или животнаго, изъ которой лѣкарство готовится, при всѣхъ же средствахъ упоминается оффицинальный препаратъ (тинктура - ли, или эссенція, ²⁾ растворъ или растираніе). Кромѣ того, указывается также, ядовито-ли средство или нѣтъ. Ядовитость обозначается крестомъ (†), стоящимъ за названіемъ средства, которое въ нисшихъ дѣленіяхъ при неосторожномъ употребленіи слишкомъ частыхъ пріемовъ могутъ вызывать побочныя явленія.

Затѣмъ приводятся антидоты, т. е. средства противо-дѣйствующія, примѣняемыя при слишкомъ сильномъ или даже вредномъ дѣйствиіи описаннаго средства. Такъ какъ

¹⁾ Что это лѣкарствовѣдѣніе отвѣчаетъ дѣйствительной въ немъ потребности, доказываютъ появившіяся въ теченіе 6 лѣтъ 4 изданія его, изъ которыхъ 4-е было повторено два раза.

²⁾ Тинктуры готовятся изъ сухихъ веществъ при помощи спирта, эссенціи — изъ свѣжихъ, сочныхъ растеній.

однако приведенныя въ качествѣ антидотовъ гомеопатическія средства могутъ дѣйствовать антидотарно лишь на основаніи гомеопатическаго принципа подобія симптомовъ, то отсюда слѣдуетъ, что они должны быть болѣе или менѣе сродственны или подобны примѣненному средству, иначе говоря—они должны принадлежать къ тѣмъ средствамъ, которыя, въ случаѣ недостаточнаго дѣйствія даннаго лѣкарства, могли бы быть выбраны и примѣнены вмѣсто послѣдняго. Исключеніемъ отсюда является *камфора*, которая, по мнѣнію Ганемана, имѣетъ то особенное свойство, что она уничтожаетъ дѣйствіе почти всѣхъ средствъ, принадлежащихъ главнымъ образомъ къ растительному и животному царствамъ¹⁾. На этомъ однако кончается ея дѣйствіе, а слѣдовательно она и не можетъ замѣнить уничтоженнаго ею средства въ лѣчебномъ смыслѣ, какъ это дѣлаютъ другіе гомеопатическіе антидоты. Далѣе полагаютъ, что высшія и наивысшія дѣленія могутъ служить антидотами нисшихъ дѣленій того же средства, но не наоборотъ.

Многимъ читателямъ покажется страннымъ при чтеніи этой книги, что почти каждое средство имѣетъ противоположныя или противорѣчащія другъ другу дѣйствія, какъ, на примѣръ: запоръ и поносъ, спячку и бессонницу, увеличенное и уменьшенное мочеотдѣленіе, возбужденіе и угнетеніе и мн. друг. Основано это на свойствѣ средства вызывать *первичное* и *вторичное* дѣйствіе, при чемъ послѣдовательное (вторичное) дѣйствіе противоположно первичному. Часто однако эти дѣйствія чередуются, такъ что раньше является послѣдовательное дѣйствіе какъ первичное, а послѣднее въ этомъ случаѣ слѣдуетъ послѣ перваго какъ вторичное дѣйствіе. Поэтому можно оба рода дѣйствія примѣнять въ болѣзняхъ гомеопатически, по закону подобія, если только средство соотвѣтствуетъ *причинѣ*, вызывающей общую картину болѣзни. На этомъ основаніи даютъ, на примѣръ, *нуксъ-вомику* какъ при запорѣ, такъ и при поносѣ, если только общій характеръ болѣзни

¹⁾ Это свойство камфоры подвергается многими сомнѣнію. Новыхъ наблюденій и опыта на этотъ счетъ однако не имѣется пока, и вопросъ остается еще открытымъ.

соотвѣтствуетъ этому средству. Всегда, значить, должно доискиваться причины, повода болѣзни, если желательнo съ увѣренностью найти подходящее средство. Не подобіе лишь симптомовъ должно руководить нами при выборѣ средства, но прежде всего причина, корень болѣзни (какъ, на примѣръ, простуда, несвареніе пищи и мн. друг.) и затѣмъ только подобіе симптомовъ.

Что касается приводимой также продолжительности дѣйствія средствъ, то она основана главнымъ образомъ на заявленіяхъ Яра, правильность которыхъ, однако, насколько они касаются именно продолжительности, оспаривается многими гомеопатами. Поэтому не слѣдуетъ ужъ очень на нихъ полагаться, во избѣжаніе возможнаго иной разъ замедленія или даже совершенной неудачи въ лѣченіи.

При большинствѣ средствъ указана потенція (дѣленіе) или степень разведенія, оказавшаяся въ практикѣ наилучшей. Тамъ же, гдѣ она не указана, слѣдуетъ полагать, что наилучшая еще неизвѣстна или, смотря по обстоятельствамъ, всѣ степени разведенія одинаково примѣнимы.

Вообще считается правиломъ, что при минеральныхъ и металлическихъ средствахъ (съ нѣкоторыми исключеніями, которыя приводятся) равно какъ при карбо, графитѣ, лycopodіумѣ и тунѣ, высшія дѣленія (15—30) дѣйствительнѣе. При туѣ физиологическое дѣйствіе будто бы даже усиливается по мѣрѣ разведенія до 1000 дѣленія! ¹⁾ Средства изъ животнаго и растительнаго царствъ часто дѣйствительны единственно лишь въ низкихъ дѣленіяхъ (какъ, на примѣръ, камфора, мускусъ и др.). Острыя и бурно наступающія, опасныя для жизни, болѣзни, во всѣхъ возрастахъ и у всѣхъ людей, обыкновенно требуютъ болѣе среднихъ (6—15) и

¹⁾ Такъ какъ почти вездѣ въ качествѣ нормальной системы разведеній лѣкарствъ принята десятичная (1 : 9), то и въ этомъ лѣкарствовѣдѣніи всѣ указанія дѣленій относятся къ десятичной системѣ. (Сотенная система = 1 : 100, поэтому 1-е сотенное дѣленіе соотвѣтствуетъ 2-му десятичному, второе—четвертому, третье—шестому и т. д.).

низкихъ (1—3) дѣленій, и, смотря по обстоятельствамъ, даже цѣльныхъ тинктуръ. Наоборотъ, для хроническихъ, затяжныхъ, медленно протекающихъ, запущенныхъ или глубоко укоренившихся болѣзней годятся болѣе высшія, высокія и наивысшія дѣленія (15—30 до 200 и выше), такъ какъ они глубже дѣйствуютъ и дѣйствіе ихъ обыкновенно продолжительнѣе. Вообще говоря, средства изъ животнаго и растительнаго царствъ годятся больше для острыхъ и свѣжихъ заболѣваній, такъ какъ они быстрѣе дѣйствуютъ. Напротивъ того, для хроническихъ и укоренившихся недуговъ они за нѣкоторыми исключеніями (какъ, напр. туя и друг.) менѣе пригодны: въ этихъ случаяхъ лучше подходятъ металлическія и минеральныя средства, которыя, кромѣ нѣкоторыхъ (какъ, наприм., арсеникъ и друг.), дѣйствуютъ медленно, но за то продолжительно. Итакъ, обыкновенно въ острыхъ болѣзняхъ, особенно вначалѣ, примѣняются *первыя* средства, въ хроническихъ же и въ оставшихся послѣ острыхъ болѣзней страданіяхъ, для довершенія лѣченія — *вторыя*, вообще же надо помнить, что и тутъ, какъ при каждомъ правилѣ, возможны исключенія.

Дѣти и болѣе молодые субъекты, равно какъ нервныя, истеричныя, чувствительныя и раздражительныя больныя, особенно въ хроническихъ и конституціональных недугахъ, вообще болѣе воспріимчивы къ высшимъ дѣленіямъ, чѣмъ люди нормально здоровые, а также лица средняго и старческаго возраста. Съ другой стороны продолжительность дѣйствія лѣкарствъ у такихъ больныхъ въ большинствѣ случаевъ короткая. Также полагаютъ, что деревенскіе жители, равно какъ тѣ, которые ведутъ простой, умѣренный и трезвый образъ жизни, работаютъ физически, дѣлаютъ много движеній и пребываютъ на свѣжемъ воздухѣ, реагируютъ лучше на лѣкарства, чѣмъ горожане или такіе, которые ведутъ сидячій образъ жизни или предаются излишествамъ и наслажденіямъ; поэтому у первыхъ высшія дѣленія большею частію дѣйствуютъ очень хорошо и цѣлбно, тогда какъ у послѣднихъ они часто остаются безъ успѣха.

Торпидныя (безчувственные, притупленные) н а т у р ы и лица съ слабой раздражительностью, равно какъ болѣзни у лицъ съ недостаточной реакціей требуютъ обыкновенно нисшихъ дѣленій (но иногда и высшихъ).

При діететическихъ погрѣшностяхъ и при разстройствахъ пищеваренія высшія дѣленія оказываются часто недействительными, тогда какъ вѣрнѣе дѣйствуютъ среднія и нисшія, которыя поэтому и слѣдуетъ въ такихъ случаяхъ предпочитать. Вообще же практикующій гомеопатъ долженъ пользоваться всѣми дѣленіями безъ исключенія, если онъ желаетъ имѣть успѣхъ, и поэтому слѣдуетъ имѣть ихъ всегда въ запасѣ, по крайней мѣрѣ полихресты ¹⁾.

Во всякомъ же случаѣ не слѣдуетъ придерживаться *одного* лишь дѣленія, будь оно 3 или 30, что было бы безцѣльной односторонностію и исключительностію, которая очень часто ведетъ къ неудачамъ, ибо никакого дѣленія нельзя считать абсолютно лучшимъ, но всѣ находятъ себѣ оправданіе въ томъ или другомъ случаѣ, смотря по роду болѣзни и по индивидуальности больного; если же на указанные при отдѣльных средствахъ дѣленія и можно смотрѣть какъ на обыкновенныя, то ихъ все-таки не слѣдуетъ считать исключительными, не допускающими никакихъ уклоненій.

У многихъ пациентовъ низкія (1—3) дѣленія вызываютъ непріятныя первичныя дѣйствія, или такъ называемыя лѣкарственныя ухудшенія, нисколько не полезныя для цѣли лѣченія. Болѣе того: низкія дѣленія скорѣе задерживаютъ излѣченіе, пугаютъ больныхъ и часто отталкиваютъ

¹⁾ Подъ полихрестами понимаютъ такія средства, которыя имѣютъ многостороннюю и обширную область примѣненія, и должны поэтому находиться даже въ самыхъ малыхъ аптечкахъ. Къ этимъ средствамъ принадлежатъ особенно: *аконитъ, антимоніумъ, аписъ, арника, белладонна, бріонія, вератрумъ, гепаръ, ипекакуана, калькарея, карбоника, карбо вегетабилисъ, меркуріусъ, нуксъ-вомика, пульсатилла, русъ, сенія, силиція, сульфуръ, туя, фосфоръ, хамомилла, хина* и друг. Впрочемъ, относительно того, какія средства суть полихресты и какія нѣтъ, между гомеопатами существуютъ разныя мнѣнія, и вопросъ этотъ представляетъ еще много неопредѣленнаго.

ихъ отъ гомеопатіи, а потому лучше ихъ избѣгать. Для такихъ больныхъ лучшими оказываются среднія дѣленія (6 — 15) или нѣсколько высшія и высокія (15 — 30). Очень высокія дѣленія (30—200 и выше) также весьма часто вызываютъ у крайне чувствительныхъ и раздражительныхъ лицъ непріятныя ухудшенія, которыя нерѣдко долго держатся и съ трудомъ устраняются; поэтому ихъ должно избѣгать, если желательно лѣчить скоро, вѣрно и пріятно (*cito, tuto et jucunde*). У такихъ лицъ въ подобныхъ случаяхъ оказываются часто нѣжнѣе дѣйствующими какъ разъ низкія дѣленія (точно также нерѣдко бываетъ и обратное). Въ этомъ отношеніи низшія и высшія дѣленія сходятся, показывая, что и тутъ крайности соприкасаются между собою. Всего нѣжнѣе дѣйствуютъ повидимому среднія дѣленія (6 — 15), почему они и пріобрѣтаютъ себѣ все больше и больше поклонниковъ.

Что касается повторенія лѣкарственныхъ пріемовъ, то уже давно, и съ пользой для результатовъ гомеопатическаго лѣченія, оставили, благодаря указаніямъ опыта, абстрактное правило Ганемана — давать въ каждомъ случаѣ болѣзни лишь одинъ пріемъ лѣкарства. Въ новѣйшее время во многихъ случаяхъ отступили и отъ той прежней практики, которая, опираясь на мнимодолгую продолжительность дѣйствія лѣкарствъ, назначала въ хроническихъ болѣзняхъ рѣдкіе, чрезъ длинные промежутки времени повторяемые пріемы; теперь даютъ лѣкарство въ болѣе частыхъ пріемахъ, притомъ съ хорошимъ успѣхомъ.

Въ острыхъ и очень острыхъ болѣзняхъ, съ опасностью для жизни и быстрымъ теченіемъ, равно какъ послѣ простудъ и при свѣже наступившихъ случаяхъ нездоровья или болѣе рекомендуются, особенно вначалѣ, очень частые, быстро другъ за другомъ слѣдующіе пріемы, болѣе частые именно, чѣмъ въ обыкновенныхъ случаяхъ (даже до 5-ти минутныхъ промежутковъ времени), при чемъ полезно иной разъ мѣнять дѣленія. Чѣмъ бурнѣе, острѣе и быстрѣе протекаетъ болѣзнь, тѣмъ чаще должно принимать лѣкарство; то же, когда болѣзнь угрожаетъ опасностью жизни.